



DEXILANT

dexlansoprazole

30 MG | 60 MG DELAYED RELEASE CAPSULES

AÚN BUSCA ALIVIO PARA LA ACIDEZ?

Si tiene acidez habitual dos o más veces por semana, a pesar de realizar cambios en el tratamiento y la dieta, podría tratarse de un síntoma de enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD).



Hable con su médico acerca de DEXILANT

Consulte la información importante sobre seguridad en la página 5.

Qué es la GERD?


La enfermedad por reflujo gastroesofágico, o GERD, se produce cuando el ácido estomacal que se emplea en la digestión reiteradamente regresa al esófago, es decir, hay un reflujo. GERD también se conoce como enfermedad por reflujo ácido.

La acidez, que a menudo se describe como dolor o ardor en el pecho, es un síntoma frecuente de GERD. Otros síntomas incluyen sabor agrio en la boca y eructos.

Hable con su médico acerca de los síntomas. El esófago, al estar constantemente expuesto al ácido estomacal, puede irritarse y, posiblemente, lesionarse, afección conocida como esofagitis erosiva.

¿Cuál es la causa de GERD?

Al comer, millones de bombas diminutas en el estómago producen el ácido que ayuda a digerir los alimentos. Una válvula, llamada esfínter esofágico inferior (EEI), que se encuentra entre el esófago y el estómago permite el ingreso de alimentos y líquidos al estómago. Si la válvula no se cierra por completo, o si se abre con demasiada frecuencia, el ácido estomacal puede subir al esófago y causar síntomas de GERD.



¿Puede la GERD ser una enfermedad crónica?

GERD es un trastorno digestivo a largo plazo o crónico. Debido a que la acidez y otros síntomas de GERD afectan a distintas personas de diferentes maneras, es importante que hable con su médico. Solo su médico puede diagnosticar GERD y determinar si se han producido lesiones (erosiones) en el esófago.




DEXILANT (dexlansoprazole)
PUEDA ALIVIAR LA ACIDEZ
POR GERD DURANTE
TODO EL DÍA Y TODA LA NOCHE



Diversos estudios clínicos han demostrado que DEXILANT proporciona hasta 24 horas de alivio para la acidez por GERD. También han demostrado que las cápsulas de DEXILANT sanan las erosiones en el esófago y evitan que se vuelvan a producir. Los resultados individuales pueden variar.

EN UN SOLO COMPRIMIDO, DEXILANT LIBERA EL MEDICAMENTO PARA GERD EN DOS INSTANCIAS



Interpretación artística. No es una representación real de los gránulos.

El gránulo 1 comienza a liberar el medicamento en el plazo de una hora luego de tomar la cápsula de DEXILANT. El gránulo 2 realiza una segunda liberación del medicamento aproximadamente 4 o 5 horas después. Se desconoce el vínculo entre esta información y su beneficio terapéutico.

Información Importante sobre Seguridad

DEXILANT podría no ser adecuado para todas las personas. No tome DEXILANT si es alérgico a DEXILANT o a cualquiera de sus ingredientes, o si toma un medicamento que contiene rilpivirina. Se han informado reacciones alérgicas graves. Informe al médico si presenta alguno de los siguientes síntomas con DEXILANT: erupción, hinchazón de la cara, opresión en la garganta o dificultad para respirar. El alivio de los síntomas no descarta otras afecciones estomacales graves.

Consulte la información importante sobre seguridad adicional en la página 5.



DEXILANT

dexlansoprazole

30 MG | 60 MG DELAYED RELEASE CAPSULES



Tome DEXILANT en cualquier momento del día, con o sin comida

Siempre que tome las cápsulas de DEXILANT, recuerde:

- ✓ Trague la cápsula entera.
- ✓ Si tiene problemas para tragar enteras las cápsulas de DEXILANT, puede abrirlas y espolvorear el contenido en una cucharada de puré de manzana. Simplemente asegúrese de tragar la mezcla con puré de manzana de inmediato.
- ✓ No mastique los gránulos en la mezcla con puré de manzana ni la guarde para consumirla más tarde.
- ✓ Asegúrese de tomar las cápsulas de DEXILANT exactamente como se le ha recetado y por el tiempo que le haya indicado el médico.

98% de los pacientes indicó que resulta práctico tomar DEXILANT*

94% de los pacientes recomendaría a sus amigos o familiares con GERD que a sus médicos acerca de DEXILANT**

*De acuerdo a una encuesta realizada por Internet en enero de 2011, donde participaron 4,013 usuarios adultos que aportaron información y contaban con diagnóstico profesional de GERD/enfermedad por reflujo ácido/EE.

La incidencia de efectos secundarios con DEXILANT es baja

Estudios con más de 4,500 adultos demostraron que DEXILANT presentó una baja incidencia de efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes fueron diarrea (4.8 %), dolor de estómago (4.0 %), náuseas (2.9 %), resfrío común (1.9 %), vómitos (1.6 %) y gases (1.6 %).

Consulte la información importante sobre seguridad en la página 5.

Usos de DEXILANT (dexlansoprazol) en cápsulas de liberación retardada de 30 mg y 60 mg

Las cápsulas recetadas de DEXILANT se usan en adultos durante 4 semanas para tratar la acidez relacionada con GERD, durante un máximo de 8 semanas para sanar las lesiones relacionadas con la acidez en el revestimiento del esófago (lo cual se denomina esofagitis erosiva o EE) y durante un máximo de 6 meses para continuar sanando la EE y proporcionando alivio para la acidez. La mayoría de las lesiones (erosiones) sanan en 4 a 8 semanas. Los resultados individuales pueden variar.

Información importante sobre seguridad

DEXILANT podría no ser adecuado para todas las personas. No tome DEXILANT si es alérgico a DEXILANT o a cualquiera de sus ingredientes, o si toma un medicamento que contiene rilpivirina. Se han informado reacciones alérgicas graves. Informe al médico si presenta alguno de los siguientes síntomas con DEXILANT: erupción, hinchazón de la cara, opresión en la garganta o dificultad para respirar. El alivio de los síntomas no descarta otras afecciones estomacales graves. Podría presentarse un tipo de problema renal llamado nefritis intersticial aguda en cualquier momento durante el tratamiento con medicamentos inhibidores de la bomba de protones (IBP), incluido DEXILANT. Llame de inmediato a su médico si observa una disminución en la cantidad de orina o si presenta sangre en la orina. DEXILANT podría aumentar su riesgo de tener diarrea intensa. Llame de inmediato a su médico si presenta heces líquidas, dolor de estómago y fiebre que no cede. Quienes toman muchas dosis diarias de medicamentos IBP por un período de tiempo prolongado (un año o más) podrían tener un mayor riesgo de sufrir fracturas de cadera, muñeca o columna vertebral. Algunas personas que toman IBP podrían desarrollar determinados tipos de lupus eritematoso o un empeoramiento de la afección. Llame de inmediato a su médico si presenta dolor articular o erupción en las mejillas o los brazos que empeora con el sol. Hable con su médico acerca de la posibilidad de presentar deficiencia de vitamina B-12 si ha estado tomando DEXILANT por tiempo prolongado (más de 3 años). Algunas personas que toman medicamentos IBP pueden tener niveles bajos de magnesio. Las personas que toman medicamentos IBP durante mucho tiempo (especialmente más de 1 año) tienen un mayor riesgo de desarrollar un cierto tipo de crecimiento estomacal llamado pólipos de glándula fúndica. Los efectos secundarios más frecuentes de DEXILANT en adultos fueron diarrea (4.8 %), dolor de estómago (4.0 %), náuseas (2.9 %), resfrío común (1.9 %), vómitos (1.6 %) y gases (1.6 %). Antes de comenzar a tomar DEXILANT, informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. Puede existir interacción entre DEXILANT y ciertos medicamentos. **Informe a su médico todos los medicamentos que toma**, incluidos medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Informe a su médico si está tomando metotrexato, rilpivirina, atazanavir, nelfinavir, saquinavir, digoxina, productos que contienen hierro, erlotinib, dasatinib, nilotinib, micofenolato mofetilo, ketoconazol/itraconazol, tacrolimus, hierba de San Juan o rifampicina. Si está tomando DEXILANT con warfarina, es posible que deba someterse a controles porque podría presentar riesgos graves.

Se le recomienda que informe a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Hable con su médico o profesional de atención médica. Consulte la Información de prescripción completa que se adjunta, incluida la Guía del medicamento para DEXILANT.

Use las siguientes preguntas para hablar con su médico acerca de sus síntomas

1. **Tengo acidez o síntomas de reflujo ácido** ___ días a la semana
2. **He estado teniendo estos síntomas desde hace...**
 - Menos de 6 meses
 - 1 a 3 años
 - 6 meses a 1 año
 - Más de 3 años
3. **Describiría mis síntomas como...**
 - Leves
 - Intensos
 - Moderados
4. **Generalmente tengo acidez...**
 - Durante el día
 - Por la noche
 - Después de comer algo picante
5. **Tengo acidez nocturna...**
 - 1 noche a la semana o menos
 - 2 a 3 noches a la semana
 - Más de 4 noches a la semana
6. **Actualmente, trato la acidez con...**
 - Antiácidos o medicamentos de venta libre
 - Medicamentos de venta con receta, como inhibidores de la bomba de protones (IBP)
 - Medicamentos de venta con receta que tomo más de una vez al día
 - Medicamentos de venta con receta más medicamentos de venta libre
 - No estoy tratando mi afección
7. **Trato la acidez con un medicamento de venta con receta e igualmente tengo síntomas...**
 - 1 día a la semana o menos
 - 6 a 7 días a la semana
 - 2 a 3 días a la semana
 - Nunca
 - 4-5 días a la semana

Consulte la información importante sobre seguridad en la página 5.

Pregúntele a su médico si DEXILANT es adecuado para usted y pida una muestra gratis!



Pague tan solo \$20* para recetas de 30 días o 90 días, si corresponde

Visite DEXILANT.com para obtener más información

*Debe cumplir con los requisitos de elegibilidad. Para el caso de pacientes con seguro comercial, esta tarjeta de ahorro cubre los gastos de bolsillo de más de \$20, y el beneficio máximo es de \$55 para una receta de 30 días o de \$165 para una receta de 90 días. Para el caso de pacientes sin seguro, consulte los términos y condiciones.

INSTANT SAVINGS CARD	 DEXILANT dexlansoprazole 30 MG 60 MG DELAYED RELEASE CAPSULES
To activate this card go to www.DAPactivate.com or call 1-866-279-5598	PAY AS LITTLE AS \$20*
RxBIN: 610524 RxGRP: 50776844 ID: XXXXXXXXX RxPCN: 1016 ISSUER: (80840)	FOR YOUR PRESCRIPTION <small>*Subject to maximum benefit. Must meet Eligibility Requirements.</small>

Ayuda al Alcance de su Mano de Takeda ofrece asistencia económica para pacientes que necesitan ayuda para adquirir sus medicamentos de Takeda

Llame al 1-800-830-9159 o visite www.TakedaHelpAtHand.com para obtener más información

Consulte la información importante sobre seguridad en la página 5.

DEXILANT and DEXILANT (with design) are trademarks of Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc., registered in the U.S. Patent and Trademark Office and used under license by Takeda Pharmaceuticals America, Inc.



©2018 Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.
USD/DEX/16/0076(2)a 10/18

**GUÍA DEL MEDICAMENTO
DEXILANT
(dexlansoprazol)
cápsulas de liberación retardada, para uso oral**

Lea esta Guía del medicamento antes de comenzar a tomar DEXILANT y cada vez que reciba una reposición. Es posible que haya información nueva. Esta información no reemplaza la consulta con su médico sobre su afección médica o su tratamiento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre DEXILANT?

DEXILANT puede ayudar con sus síntomas relacionados con la acidez, pero podría seguir teniendo problemas estomacales graves. Hable con su médico.

DEXILANT puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Un tipo de problema renal (nefritis intersticial aguda).** Algunas personas que reciben medicamentos inhibidores de la bomba de protones (IBP) pueden presentar un tipo de problema renal denominado nefritis intersticial aguda, que puede producirse en cualquier momento durante el tratamiento con medicamentos IBP. Comuníquese de inmediato con su médico si observa una disminución en la cantidad de orina o si presenta sangre en la orina.
- **Diarrea.** DEXILANT podría aumentar su riesgo de tener diarrea intensa. Esta diarrea puede producirse por una infección (*Clostridium difficile*) en los intestinos.
Comuníquese de inmediato con su médico si presenta heces líquidas, dolor de estómago y fiebre que no cede.
- **Fracturas óseas.** Quienes reciben muchas dosis diarias de medicamentos IBP por un período prolongado (un año o más) podrían tener un mayor riesgo de sufrir fracturas de cadera, muñeca o columna vertebral. Debe tomar DEXILANT exactamente como se lo receten, a la dosis más baja posible para su tratamiento y durante el menor tiempo necesario. Hable con su médico sobre su riesgo de fracturas óseas si toma DEXILANT.
- **Ciertos tipos de lupus eritematoso.** El lupus eritematoso es un trastorno autoinmunitario (las células inmunitarias del cuerpo atacan a otras células u órganos del cuerpo). Algunas personas que reciben medicamentos IBP pueden presentar ciertos tipos de lupus eritematoso o sufrir un empeoramiento del lupus que ya tienen. Llame de inmediato a su médico si observa aparición o empeoramiento de dolor articular, o erupción en las mejillas o los brazos que empeora con el sol.

DEXILANT puede tener otros efectos secundarios graves. Consulte “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DEXILANT?”.

¿Qué es DEXILANT?

DEXILANT es un medicamento de venta bajo receta denominado inhibidor de la bomba de protones (IBP). DEXILANT reduce la cantidad de ácido en el estómago.

DEXILANT se usa en personas mayores de 12 años:

- Durante un máximo de 8 semanas para sanar las lesiones relacionadas con la acidez en el revestimiento del esófago (lo cual se denomina esofagitis erosiva o EE).
- Durante un máximo de 6 meses en adultos y durante un máximo de 16 semanas en niños de 12 a 17 años para continuar sanando la esofagitis erosiva y aliviar la acidez.
- Durante un máximo de 4 semanas para tratar la acidez relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

La ERGE se produce cuando el ácido del estómago ingresa en el tubo (esófago) que conecta la boca con el estómago. Esto puede provocar una sensación de ardor en el pecho o la garganta, sabor agrio o eructos.

Se desconoce si DEXILANT es seguro y eficaz en niños menores de 12 años.

DEXILANT no es eficaz para los síntomas de la ERGE en niños menores de 1 año.

¿Quiénes no deben tomar DEXILANT?

No tome DEXILANT si:

- Es alérgico al dexlansoprazol o a alguno de los ingredientes de DEXILANT. Consulte el final de esta Guía del medicamento para obtener una lista completa de los ingredientes de DEXILANT.
- Recibe un medicamento que contiene rilpivirina (EDURANT, COMPLERA) que se usa para tratar el VIH-1 (virus de la inmunodeficiencia humana).

¿Qué debo informarle a mi médico antes de tomar DEXILANT?

Antes de tomar DEXILANT, informe a su médico si:

- Le han dicho que tiene niveles bajos de magnesio en la sangre.
- Tiene problemas hepáticos.
- Tiene otras afecciones médicas.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. DEXILANT puede dañar a su bebé en gestación. Hable con su médico sobre los posibles riesgos para un bebé en gestación si se toma DEXILANT durante el embarazo.
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si DEXILANT pasa a la leche materna o si afectará a su bebé o a su leche materna. Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma DEXILANT.

Informe a su médico todos los medicamentos que toma, incluidos medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. DEXILANT puede afectar la manera en que otros medicamentos actúan, y otros medicamentos pueden afectar la manera en que actúa DEXILANT. En especial, informe a su médico si recibe metotrexato (Otrexup, Rasuvo, Trexall).

Conozca los medicamentos que toma. Haga una lista de estos medicamentos para mostrársela a su médico y farmacéutico cuando obtenga un nuevo medicamento.

¿Cómo debo tomar DEXILANT?

- Tome DEXILANT exactamente como se lo recete su médico.
- No cambie su dosis ni deje de tomar DEXILANT sin hablar antes con médico.
- Tome DEXILANT con o sin alimentos.
- Trague las cápsulas de DEXILANT enteras. No mastique las cápsulas ni los gránulos que están dentro de las cápsulas.
- Si tiene problemas para tragar una cápsula entera, puede abrirla y tomar el contenido con puré de manzana. Consulte las "Instrucciones de uso" al final de esta Guía del medicamento para ver las instrucciones de cómo administrar DEXILANT con puré de manzana.
- Consulte las "Instrucciones de uso" al final de esta Guía del medicamento para ver las instrucciones sobre cómo mezclar y administrar DEXILANT con agua usando una jeringa oral o a través de una sonda nasogástrica.
- Si omite una dosis de DEXILANT, tómela en cuanto se acuerde. Si ya es casi el horario de la dosis siguiente, no tome la dosis omitida. Tome su dosis siguiente en el horario habitual. No tome 2 dosis al mismo tiempo para compensar la dosis omitida.
- Si toma DEXILANT en exceso, llame de inmediato a su médico o al centro de intoxicación al 1-800-222-1222, o acuda a la sala de emergencias del hospital más cercano.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DEXILANT?

DEXILANT puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre DEXILANT?”.**
- **Deficiencia de vitamina B12.** DEXILANT reduce la cantidad de ácido en el estómago. El ácido del estómago es necesario para absorber la vitamina B12 correctamente. Hable con su médico sobre la posibilidad de presentar deficiencia de vitamina B12 si ha estado tomando DEXILANT por un tiempo prolongado (más de 3 años).
- **Niveles bajos de magnesio en el cuerpo.** Este problema puede ser grave. Algunas personas que reciben medicamentos IBP durante al menos 3 meses pueden tener niveles bajos de magnesio. En general, los niveles bajos de magnesio se observan después de un año de tratamiento. Puede tener o no síntomas de niveles bajos de magnesio.

Informe a su médico de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas:

- convulsiones
- mareos
- latidos cardíacos anormales o rápidos
- agitación
- movimientos espasmódicos o temblores
- debilidad muscular
- espasmos de las manos y los pies
- calambres o dolores musculares
- espasmo de la laringe

Su médico puede controlar su nivel de magnesio en el cuerpo antes de que comience a tomar DEXILANT, o durante el tratamiento, si va a tomar DEXILANT por un período prolongado.

- **Crecimientos en el estómago (pólipos de glándulas fúndicas).** Las personas que reciben medicamentos IBP por un tiempo prolongado tienen un mayor riesgo de presentar un determinado tipo de crecimiento en el estómago denominado pólipos de glándulas fúndicas, especialmente después de recibir los medicamentos IBP durante más de 1 año.

Los efectos secundarios más frecuentes de DEXILANT en adultos incluyen los siguientes:

- diarrea
- dolor de estómago
- náuseas
- resfrío común
- vómitos
- gases

Los efectos secundarios más frecuentes de DEXILANT en niños de 12 a 17 años incluyen los siguientes:

- dolor de cabeza
- dolor de estómago
- diarrea
- dolor o hinchazón (inflamación) en la boca, la nariz o la garganta

Otros efectos secundarios:

Reacciones alérgicas graves. Informe a su médico si presenta alguno de los siguientes síntomas con DEXILANT:

- erupción
- hinchazón de la cara
- opresión en la garganta
- dificultad para respirar

Su médico puede interrumpir la administración de DEXILANT si se observan estos síntomas.

Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DEXILANT. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo almacenar DEXILANT?

- Almacene DEXILANT a temperatura ambiente entre 68° F y 77° F (entre 20° C y 25° C).

Mantenga DEXILANT y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de DEXILANT

A veces se recetan medicamentos para fines que no son los descritos en una Guía del medicamento. No use DEXILANT para una afección para la cual no haya sido recetado. No les dé DEXILANT a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted. Puede provocarles un daño.

Esta Guía del medicamento resume la información más importante sobre DEXILANT. Si desea obtener más información, hable con su médico. Puede solicitar a su médico o farmacéutico información sobre DEXILANT escrita para profesionales de la salud.

Para obtener más información, visite www.DEXILANT.com o llame al 1-877-825-3327.

¿Cuáles son los ingredientes de DEXILANT?

Ingrediente activo: dexlansoprazol.

Ingredientes inactivos: esferas de azúcar, carbonato de magnesio, sacarosa, hidroxipropilcelulosa de baja sustitución, dióxido de titanio, hidroxipropilcelulosa, hipromelosa 2910, talco, copolímeros de ácido metacrílico, polietilenglicol 8000, trietilcitrate, polisorbato 80 y dióxido de silicio coloidal. La cubierta exterior de la cápsula está hecha de hipromelosa, carragenina y cloruro de potasio. En función del color de la cubierta exterior de la cápsula, el azul contiene FD&C azul n.º 2 laca de aluminio; el gris contiene óxido de hierro negro; y ambos contienen dióxido de titanio.

INSTRUCCIONES DE USO
DEXILANT
(dexlansoprazol)
cápsulas de liberación retardada,
para uso oral

Cómo administrar DEXILANT con puré de manzana:

1. Coloque 1 cucharada de puré de manzana en un recipiente limpio.
2. Abra la cápsula con cuidado y esparza los gránulos sobre el puré de manzana.
3. Trague el puré de manzana y los gránulos de inmediato. No mastique los gránulos.
No guarde la mezcla de puré de manzana y gránulos para usar más adelante.

Cómo administrar DEXILANT con agua usando una jeringa oral:

1. Coloque 20 ml de agua en un recipiente limpio.
2. Abra la cápsula con cuidado y vacíe los gránulos en el recipiente con agua.
3. Use una jeringa oral para extraer la mezcla de agua y gránulos.
4. Revuelva suavemente la jeringa oral para que los gránulos no se asienten.
5. Coloque la punta de la jeringa oral en la boca. Administre el medicamento de inmediato.
No guarde la mezcla de agua y gránulos para usar más adelante.
6. Vuelva a cargar la jeringa con 10 ml de agua y revuelva suavemente. Coloque la punta de la jeringa oral en la boca y administre el medicamento que haya quedado en la jeringa.
7. Repita el paso 6.

Cómo administrar DEXILANT con agua a través de una sonda nasogástrica (sonda NG):

En el caso de las personas que tienen una sonda NG de **tamaño 16 French o más**, se puede administrar DEXILANT de la siguiente manera:

1. Coloque 20 ml de agua en un recipiente limpio.
2. Abra la cápsula con cuidado y vacíe los gránulos en el recipiente con agua.
3. Use una jeringa de 60 ml con punta de catéter para extraer la mezcla de agua y gránulos.
4. Revuelva suavemente la jeringa con punta de catéter para que los gránulos no se asienten.
5. Conecte la jeringa con punta de catéter a la sonda NG.
6. Administre la mezcla de inmediato a través de la sonda NG que va hacia el estómago.
No guarde la mezcla de agua y gránulos para usar más adelante.
7. Vuelva a cargar la jeringa con punta de catéter con 10 ml de agua y revuelva suavemente.
Enjuague la sonda NG con el agua.
8. Repita el paso 7.

¿Cómo debo almacenar DEXILANT?

- Almacene DEXILANT a temperatura ambiente entre 68° F y 77° F (entre 20° C y 25° C).

Mantenga DEXILANT y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Esta Guía del medicamento y las Instrucciones de uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Distribuido por:

Takeda Pharmaceuticals America, Inc.
Deerfield, IL 60015

Revisado: Junio de 2018

DEXILANT es una marca comercial de Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de EE. UU.

Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

©2009 – 2018 Takeda Pharmaceuticals America, Inc.

DEX006 R30